


Vraag	Antwoord	Scores
-------	----------	--------

## Kitmarker

---

**13 maximumscore 3**

voorbeeld van een antwoord:



- bètadeeltje rechts van de pijl 1
- He als vervalproduct, mits verkregen via kloppende atoomnummers 1
- aantal nucleonen links en rechts gelijk 1

**14 maximumscore 3**

uitkomst:  $f = 6,0 \cdot 10^{14}$  Hz

voorbeeld van een berekening:

Er geldt:  $f = \frac{E}{h} = \frac{2,5 \cdot 1,60 \cdot 10^{-19}}{6,63 \cdot 10^{-34}} = 6,0 \cdot 10^{14}$  Hz.

- gebruik van  $E_f = hf$  met opzoeken van  $h$  1
- omrekenen van eV naar J 1
- completeren van de berekening 1

**15 D**

**16 B**

Vraag	Antwoord	Scores
-------	----------	--------

**17 maximumscore 4**

uitkomst:  $d_{\frac{1}{2}} = 14 \text{ mm}$

voorbeeld van een bepaling:

Zonder aluminium is de intensiteit van de kitmarker gelijk aan  $6,00 \cdot 10^3 - 1,00 \cdot 10^3 = 5,00 \cdot 10^3$  pulsen per minuut. Na een halvering is dat

$$\frac{5,00 \cdot 10^3}{2} = 2,50 \cdot 10^3 \text{ pulsen per minuut.}$$

Het diagram moet afgelezen worden bij

$2,50 \cdot 10^3 + 1,0 \cdot 10^3 = 3,50 \cdot 10^3$  pulsen per minuut. Hieruit volgt dat de

halveringsdikte voor aluminium gelijk is aan 1,43 mm.

De halveringsdikte voor menselijk weefsel is dan gelijk aan  $1,43 \cdot 10 = 14 \text{ mm}$ .

- inzicht dat de achtergrondstraling twee keer juist verrekend moet worden 1
- consequent bepalen van  $d_{\frac{1}{2}}$  van aluminium (met een marge van 0,1 mm) 1
- juist gebruik van de factor 10 1
- completeren van de bepaling 1

*Opmerkingen*

- *Als de achtergrondstraling eenmaal juist wordt toegepast vervalt alleen de eerste deelscore.*
- *Als er geen rekening wordt gehouden met de achtergrondstraling of als deze twee keer onjuist wordt verrekend vervallen de eerste en de laatste deelscore.*
- *Er hoeft geen rekening gehouden te worden met significantie.*

Vraag	Antwoord	Scores
-------	----------	--------

**18 maximumscore 4**

voorbeeld van een antwoord:

methode 1

Voor de energie die de bestraalde lichaamsmassa in een jaar absorbeert geldt:

$$E_{\text{totaal}} = E_f \cdot A \cdot t = 1,6 \cdot 10^{-15} \cdot 1,25 \cdot 10^3 \cdot (365 \cdot 8,0 \cdot 3600) = 2,10 \cdot 10^{-5} \text{ J.}$$

Voor het jaarlijkse dosisequivalent geldt dan:

$$H = w_R D = w_R \frac{E}{m} = 1 \cdot \frac{2,10 \cdot 10^{-5}}{0,15} = 1,4 \cdot 10^{-4} \text{ Sv (= 0,14 mSv).}$$

Dit is minder dan de jaarlijkse equivalente dosislimiet.

- inzicht dat geldt  $E_{\text{totaal}} = E_f \cdot A \cdot t$  1
- gebruik van  $H = w_R D$  en  $D = \frac{E}{m}$  1
- completeren van de berekening 1
- consequente conclusie 1

of

methode 2

Voor het dosisequivalent van een foton geldt:

$$H_f = w_R D = w_R \frac{E_f}{m} = 1 \cdot \frac{1,6 \cdot 10^{-15}}{0,15} = 1,07 \cdot 10^{-14} \text{ Sv.}$$

Voor het jaarlijkse dosisequivalent geldt dan:

$$H_{\text{totaal}} = H_f \cdot A \cdot t = 1,07 \cdot 10^{-14} \cdot 1,25 \cdot 10^3 \cdot (365 \cdot 8,0 \cdot 3600) = 1,4 \cdot 10^{-4} \text{ Sv (= 0,14 mSv).}$$

Dit is minder dan de jaarlijkse equivalente dosislimiet.

- gebruik van  $H_f = w_R D$  en  $D = \frac{E_f}{m}$  1
- inzicht dat geldt  $H_{\text{totaal}} = H_f \cdot A \cdot t$  1
- completeren van de berekening 1
- consequente conclusie 1

*Opmerkingen*

- *Het gebruik van  $H = w_R D$  mag ook impliciet.*
- *Er hoeft geen rekening gehouden te worden met significantie.*