

Het RVP

In Nederland worden kinderen ingeënt tegen infectieziektes volgens het RVP, het rijksvaccinatieprogramma. Om een goede immuniteit op te bouwen worden verschillende vaccinaties meer dan eenmaal gegeven. In de tabel hieronder staat het vaccinatieschema.

leeftijd	vaccinaties						
	DKTP-Hib	Pneu	BMR	MenC	DKTP	DTP	HPV
2 maanden	X	X					
3 maanden	X	X					
4 maanden	X	X					
11 maanden	X	X					
14 maanden			X	X			
4 jaar					X		
9 jaar			X			X	
12 jaar (alleen meisjes)							X (3x)

afkortingen:

DKTP en DTP:

D Difterie
K Kinkhoest
T Tetanus
P Polio

BMR:

B Bof
M Mazelen
R Rodehond

Hib Haemophilus influenzae type b
Pneu Pneumokokken
MenC Meningokokken C
HPV Humaan Papillomavirus

- 1p 34 Hoeveel keer wordt een kind volgens het RVP ingeënt tegen polio?
- 1p 35 Sinds 1952 worden kinderen in Nederland ingeënt tegen kinkhoest, maar vanaf 1996 kwam kinkhoest toch weer regelmatig voor. Het gebruikte vaccin leverde geen goede immuniteit meer op als gevolg van mutaties in de kinkhoestbacterie.
Vanaf 2005 wordt een nieuw vaccin tegen kinkhoest gebruikt. Daardoor is het aantal gevallen van kinkhoest weer sterk afgenomen.
Tussen 2001 en 2005 werden alleen kinderen van vier jaar met dit nieuwe vaccin ingeënt. Dit had een afname van kinkhoest tot gevolg in deze groep kinderen. Bovendien bleek dat ook bij baby's het aantal kinkhoestgevallen afnam, hoewel die nog met het oude vaccin werden ingeënt.
→ Leg uit waardoor vaccinatie van kinderen van 4 jaar tegen een bepaalde ziekte tot gevolg kan hebben dat ook minder baby's die ziekte krijgen.